Nové trendy obhospodařování půdy umožňující obnovu vodního režimu
Jaroslav Záhora

Osnova přednášky


1 Proč je třeba obnovit vodní režim půd
2 Od srážek k vodě dostupné rostlinám
3 Obnova infiltrace a funkční půdní struktury
4 Organická hmota jako zdroj energie
5 Biologická regulace půdních procesů
6 Nové systémy hospodaření a jejich kombinace
7 Jak měřit skutečnou obnovu vodního režimu
8 Závěry

1. Proč potřebujeme obnovit vodní režim půd?



Změna klimatu přináší nejen delší období sucha, ale také větší nepravidelnost srážek a epizody intenzivního deště. Pokud voda dopadá na půdu s degradovanou strukturou, velká část odtéká po povrchu, nebo vyvolává erozi. Následně voda v půdě chybí právě v době, kdy ji rostliny nejvíce potřebují. Je proto nutné změnit cíl hospodaření. K cílenému obnovování hydrologických funkcí půdy nestačí jen zajistit dostatečnou zásobu živin. Rozhodující je kolik vody, která dopadne na zemědělský pozemek, se skutečně dostane do půdního profilu a zda tam zůstane ve formě dostupné rostlinám.

2. Voda dostupné rostlinám



Vodní režim půdy je výsledkem vzájemného působení několika procesů:

1. Infiltrace – vstup vody přes půdní povrch.
2. Redistribuce – pohyb vody půdními póry a mezi půdními horizonty.
3. Retence – zadržování vody v půdním profilu.
4. Dostupnost rostlinám – část zadržené vody vázána tak, že ji kořeny mohou čerpat.
5. Ztráty vody – povrchový odtok, hluboká drenáž a evapotranspirace.

Je důležité rozlišovat celkovou pórovitost, rychlost infiltrace a množství rostlinám dostupné vody. Nejsou to zaměnitelné charakteristiky. Půda může mít mnoho pórů, ale nedostatečně propojených. Může také rychle přijímat vodu, která následně odteče pod hlavní kořenovou zónu. A vysoká retence sama o sobě nezaručuje, že bude voda pro rostliny snadno dostupná. Hlavní cílem není maximální množství vody v půdě za všech okolností, ale účinné zachycení srážek a jejich uchování v biologicky využitelné části půdního profilu.

3. Obnova infiltrace a funkční půdní struktury



Zásadní je obnova prostorové organizace půdy.

3.1. Omezení destrukce půdních agregátů Intenzivní zpracování půdy narušuje agregáty, myceliální (houbové) sítě a biopóry. Současně urychluje rozklad organické hmoty. Samotné omezení zpracování však není univerzálním řešením.

3.2. Propojení pórů - pro infiltraci a transport vody jsou důležité:


- stabilní makroagregáty a jejich propojené mezery;
- kanálky po kořenech a chodbičky půdních živočichů;
- omezení utužení v podorničí;

- ochrana půdního povrchu před rozplavováním a tvorbou půdního škraloupu.

3.3. Ochrana povrchu půdy

Meziplodiny, rostlinné zbytky a mulč tlumí dopad dešťových kapek, zpomalují povrchový odtok a omezují erozi. Kořeny navíc vytvářejí biopóry, které mohou přetrvávat i po odumření rostlin.

4. Organická hmota jako zdroj energie



Organická hmota má v obnově vodního režimu trojí význam:

- Fyzikální: ovlivňuje agregaci, pórovitost a některé vlastnosti retence vody.
- Chemický: přispívá k sorpční kapacitě a koloběhu živin.
- Biologický: představuje zdroj uhlíku a energie pro půdní organismy.

Novým trendem je přechod od jednoduchého hodnocení množství dodané organické hmoty k posuzování jejího osudu a funkce v půdě.


4.1. Ne každá organická hmota má stejnou funkci

Čerstvé rostlinné zbytky, kompost, kořenové exsudáty a mikrobiální zbytky se liší rychlostí rozkladu i tím, jak přispívají ke vzniku půdních agregátů a stabilnější organické hmoty. Část uhlíku se během mikrobiálního metabolismu uvolní jako CO_2, část se zabuduje do biomasy a část může být vázána v organominerálních asociacích, například ve frakci MAOM (mineral-associated organic matter). Jiná část zůstává v částicové organické hmotě POM (particulate organic matter). Tyto frakce mají odlišnou stabilitu a ekologickou funkci. Každý kilogram dodaného organického uhlíku automaticky neznamená stejný přírůstek stabilního uhlíku nebo stejné zvýšení vodní kapacity.

4.2. Kompost a cílené využití organických zdrojů

Kvalitní vyzrálý kompost může přispívat ke zlepšení struktury, doplňovat živiny a podporovat biologické procesy. Jeho účinek však závisí na dávce, vlastnostech kompostu, půdním typu a dlouhodobém režimu hospodaření. Zvláštní význam má kombinace kompostu s meziplodinami a omezením zpracování půdy: dodaná organická hmota není izolovaným vstupem, ale součástí systému, který průběžně vytváří kořeny, mikrobiální biomasu a nové organické vazby.

5. Biologická regulace půdních procesů: od kořenů k mikrobiálním sítím



Propojení fyzikálních, chemických a biologických procesů umožňuje vysvětlit, proč nelze obnov vodního režimu redukovat na mechanické zpracování půdy nebo na pouhou aplikaci kompostu.

5.1. Rostlina - hlavní regulátor půdního prostředí

Rostliny investují část produktů fotosyntézy do kořenů a rhizosféry. Kořenové exsudáty a slizové látky ovlivňují mikrobiální aktivitu, dostupnost živin a tvorbu biologických vazeb mezi částicemi půdy. Rozmanitost kořenových systémů přináší tyto výhody: prokořenění různých hloubek půdního profilu; vznik a zachování biopórů; přísun uhlíku do různých částí půdy; stimulaci mikrobiálních procesů v rhizosféře. Funkční meziplodiny proto není vhodné vybírat jen podle produkce nadzemní biomasy. Důležité jsou také hloubka kořenění, architektura kořenů, produkce biomasy pod zemí a termín ukončení porostu.

5.2. Mikroorganismy - tvůrci půdní struktury

Bakterie a houby zpracovávají organické vstupy, vytvářejí mikrobiální biomasu a produkují látky, které mohou přispívat ke stabilizaci agregátů. Houbová mycelia zároveň propojují půdní částice a vytvářejí prostorovou síť. Důležitá je návaznost procesů: rostliny dodávají uhlík prostřednictvím kořenů a zbytků; mikroorganismy tyto zdroje využívají a přeměňují; mikroorganismy a kořeny ovlivňují agregaci a pórovou strukturu; stabilnější struktura podporuje infiltraci, výměnu plynů a prostředí pro další biologickou aktivitu. Nejde o jednosměrný proces. Voda ovlivňuje mikrobiální aktivitu a mikrobiální aktivita může zpětně ovlivňovat strukturu, kterou se voda pohybuje.

5.3. Proč je důležitá biologická kontinuita

Období úhoru, dlouhé přestávky bez živých kořenů a opakované intenzivní narušování půdy přerušují přísun čerstvého uhlíku i kontinuitu kořenových kanálků. Novým trendem je proto udržování živých kořenů po co nejdelší vhodnou část roku, diverzifikace osevních postupů a zachování organických zbytků na povrchu. Je však třeba respektovat místní vodní bilanci. V suchých oblastech může meziplodina spotřebovávat část vody, kterou by jinak využila

následující plodina. Výsledek závisí na druhu, době ukončení porostu, množství biomasy a dostupnosti srážek.

6. Nové systémy hospodaření a jejich kombinace





Neexistuje jediná nejlepší technologie. Bude lepší představit šest vzájemně propojených směrů.




1. Funkčně diverzifikované meziplodiny
Kombinovat druhy s rozdílnou hloubkou kořenění, morfologií kořenů a produkcí biomasy. Cílem je rozvíjet biopóry a prodlužovat období, kdy půda není bez vegetačního krytu.



2. Redukované zpracování půdy
Omezit zbytečnou destrukci agregátů a biologických sítí. Intenzitu zpracování přizpůsobit utužení, textuře, odvodnění a podmínkám setí.



3. Cílené využívání kompostu a organických zbytků
Zvyšovat přísun organického uhlíku podle potřeb půdy, kvality materiálu a bilance živin. Posuzovat dlouhodobý efekt, nejen okamžitý přírůstek organické hmoty.



4. Biologická rekonstrukce sítě pórů - využívat hluboko kořenící druhy a střídání kořenových architektur. Biologické kypření je vhodné tam, kde je kořenům umožněno proniknout do zhutněných vrstev.



5. Řízení pojezdu a prevence utužení
Omezit zatížení půdy při vysoké vlhkosti, organizovat pojezdové trasy a chránit nejcitlivější části půdního profilu před opakovaným zhutňováním.



6. Precizní a adaptivní řízení
Kombinovat půdní senzory, měření infiltrace, mapování utužení a sledování porostů. Zpracování půdy, ukončení meziplodin i případnou závlahu přizpůsobovat aktuálním podmínkám. Z toho vyplývá důležitý princip: opatření mají největší smysl jako vzájemně se doplňující systém. Meziplodina nemůže dlouhodobě kompenzovat opakované těžké utužení a kompost sám o sobě nemusí odstranit nepropustnou vrstvu v podorničí.

6. Jak měřit skutečnou obnovu vodního režimu?


Nový přístup k hospodaření vyžaduje také změnu způsobu hodnocení výsledků. Nestačí sledovat pouze výnos, obsah organického uhlíku nebo celkovou pórovitost. Je třeba ověřit, zda se skutečně obnovují vodní funkce půdy.

Skupina	Doporučené ukazatele	Co nám říkají
Fyzikální	Objemová hmotnost, penetrační odpor, stabilita agregátů	Zda se zlepšuje struktura a omezuje utužení
Hydrologické	Rychlost infiltrace, hydraulická vodivost, retenční křivka	Jak voda vstupuje do půdy a pohybuje se v ní
Chemické	Organický uhlík, pH, kationtová výměnná kapacita	Jak se mění chemické prostředí a vlastnosti půdní hmoty
Biologické	Mikrobiální biomasa, půdní respirace, aktivita enzymů, kořeny a půdní fauna	Zda se obnovují biologické procesy a jejich funkce



Pro praktické hodnocení je zvláště důležité sledovat vodní režim v různých hloubkách. Zlepšení povrchové infiltrace nemusí znamenat odstranění utužení v podorničí. Stejně tak vyšší infiltrace nemusí automaticky znamenat vyšší množství vody dostupné rostlinám. Ideální je proto porovnávat různé systémy hospodaření v čase, za srovnatelných podmínek a na stejných půdních typech.

8. Závěry



1. Vodu musíme nejprve zachytit. Ochrana povrchu půdy, stabilní agregáty a propojené póry jsou základem účinné infiltrace.
2. Vodu musíme udržet v dostupné části profilu. Rozhodující je nejen celková retence, ale také rozložení pórů, jejich konektivita, hloubka kořenění a omezení nežádoucího odtoku.
3. Organickou hmotu musíme využívat funkčně. Rostlinné zbytky, meziplodiny, kořenové exsudáty a kompost vstupují do odlišných, ale vzájemně propojených procesů.
4. Biologické procesy jsou součástí řešení. Kořeny, mikroorganismy a půdní fauna přispívají k tvorbě a obnově struktury, avšak jejich účinek závisí na vodě, živinách, půdním typu a způsobu hospodaření.
5. Neexistuje univerzální technologie. Nejlepší kombinace opatření musí odpovídat konkrétnímu půdnímu profilu, klimatu, plodině a stavu degradace.

Obnova vodního režimu zemědělské půdy není otázkou toho, kolik organické hmoty do půdy dodáme nebo jak hluboko ji nakypříme. Je to otázka toho, zda dokážeme obnovit funkční propojení mezi půdní strukturou, vodou, organickým uhlíkem a biologickými procesy.